


## Übersicht der Traktergebnisse des Forstbetriebes Bad Brückenau


### Baumartenanteile der Trakte 2012 - 2021



Die Buche als häufigste Baumart in der Oberschicht und der Vorausverjüngung (VVJ) nimmt kontinuierlich ab, wobei die Verluste durch andere Baumarten ausgeglichen werden. Hierbei nimmt unerfreulicherweise die Fichte als zweit häufigste Baumart in der VVJ kontinuierlich zu. Positiv im Kontext der Vorausverjüngung ist, dass sich ein positiver Trend bei Kie, Lä und ELbH abzeichnet. Lediglich die Tanne ist gleichbleibend auf niedrigem Niveau in den Trakten vertreten.

Als Gesamtfazit bleibt eine leichte Erhöhung der Mischbaumarten zur Buche in der VVJ erkennbar, was in Richtung Waldumbau bzw. 4-Baum-Konzept als positiv zu beurteilen ist. Jedoch wäre ein stärkerer Anstieg bei den Mischbaumarten -- ohne Fichte -- wünschenswert.

## Leittriebverbiss 2012 - 2021 nach Baumarten und im Durchschnitt



Generell sind über die Jahre starke Schwankungen beim Verbiss über alle Baumarten erkennbar. Auffallend ist, dass bei mehreren Baumarten, vor allem zur Mitte des Beobachtungszeitraums, Verbisschwerpunkte erkennbar sind.

Die höchsten Verbissanteile finden sich bei den selteren Mischbaumarten wie Ta, Ei und ELbh. In der Gesamtschau ist über alle Baumarten hinweg in der abgelaufenen Dekade ein leicht steigender Trend beim Leittriebverbissprozent/Trakt erkennbar.

Der Forstbetrieb weist einen sehr hohen Anteil an verpachteten Flächen auf. Hier werden zukünftig die Verpachtungsanteile sukzessive zurückgenommen um auf den teilweise sehr starken Verbiss besser reagieren zu können.